



İLACI KULLANMADAN ÖNCE AMBALAJ ETİKETİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ !

Adana Ofis

Yeşilyurt Mah. İbo Osman Cad. 65 Sk.
Hasgöl Apt. Zemin Kat No: 1 Seyhan / ADANA
Tel : (0322) 227 77 36 - 227 71 85
Faks : (0322) 227 69 41

Ankara Ofis

Çetin Emeç Bulvarı No: 41/11 Çankaya / ANKARA
Tel : (0312) 480 19 12 - 480 19 14
Faks : (0312) 480 19 24

Antalya İrtibat (Mobil)

GSM: (0532) 282 02 24

Bursa İrtibat (Mobil)

GSM: (0532) 296 13 02

İstanbul Ofis

Defterdar Yokuşu No: 3 Tophane 34425 İSTANBUL
Tel : (0212) 334 34 00
Faks : (0212) 334 34 99



BASF Agro Genel Merkez Limburgerhof-ALMANYA

Candit® WG

“Farklı ve Güçlü”



150g kutu ambalajında

T I A T A N I T I M 0212-281 0435 CANDIT WG 04/2007-BM01

Candit® WG

“Farklı ve Güçlü”



(24 SAAT) 114 ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)

ÜRETİCİ FIRMA

BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen
Almanya

RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICISI

BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49 Penpar İşhanı, Kat 6 / 603 Çankaya 35210 İZMİR

Tel : (0232) 489 30 97 - 441 10 47

Fax: (0232) 441 12 82

BASF

The Chemical Company

Candit® WG

ETKİ ŞEKLİ :

ÇİFT ETKİLİ
Koruyucu
Tedavi Edici

Hücrede, solunum sistemini kesintiye uğratarak fungusun ölümüne neden olur.

ETKİN MADDE: %50 Kresoxim-Methyl

TOKSİSİTE : Ağız yoluyla LD₅₀:>5000 mg/kg

ÖZELLİKLER

- Quasi-sistemik
- Çiçek döneminde kullanılabilir
- Arılara zehirsiz
- Farklı bir etkili madde
- Güçlü antispörolant etki
- Bitkide yeşil bir görünüm sağlar
- Yağışlarla yıkanmaz
- Lekesiz ve kaliteli ürünler
- IPM'e uygun
- Çevreye saygılı

Quasi-Sistemik

Doğadan gelen güç!..



Strobilurus tenacellus



Genel Olarak Karaleke İlaçlama Zamanı:

1. İlaçlama

Çiçek gözleri kabardığında,

2. İlaçlama

Pembe tomurcuk devresinde,

3. İlaçlama

Çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde, hava koşullarına göre ilaçlamalara 10-14 gün aralıklarla devam edilir.

Kullanım Alanı

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIM DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g/100 lt. su	35 gün
Bağ	Bağ külleme (<i>Uncinula necator</i>)	20 g/100 lt. su	35 gün
Kabakgiller (Hıyar, kabak, kavun, karpuz)	Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> / <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	25 g/100 lt. su	4 gün
Narenciye	Alternaria yanıklığı (<i>Alternaria citri</i>)	25 g/100 lt. su	14 gün

Yaprakta karaleke



Meyvede karaleke



Bağ küllemesi



Yaprakta karaleke



Bağ küllemesi



Salatalıkta külleme



Karalekenin Gelişme Safhaları

