

Oraban® 10 SL

Yeniliklerimizi
www.agro.basf.com.tr
adresinden takip edebilirsiniz.

Canavar Avcısı



Ayçiçek, tütün ve kırmızı mercimekte canavar otuna karşı herbisit.

 **BASF**
The Chemical Company



ETKEN MADDE : 10 gr/lit Imazapic

FORMÜLASYON ŞEKLİ : SL (Suda Çözünen Konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

Bitki adı	Kontrol ettiği yabancı otlar	Kullanım dozu ve dönemi
Ayçiçek	Canavar otu (<i>Orobancha ramosa</i>) (<i>O. cumana</i>)	37.5 ml/da 1. Uygulama: 8 yapraklı dönemde 2. Uygulama: 16 yapraklı dönemde
Kırmızı Mercimek	Canavar otu (<i>Orobancha crenata</i>) (<i>O. aegyptiaca</i>)	50 ml/da 1. Uygulama: bitkiler 8-10 cm boyunda 2. Uygulama: 20-22 gün sonra
Tütün	Canavar otu (<i>Orobancha ramosa</i>)	50 ml/da Dikimden 20-25 gün sonra başlayarak 7-10 gün aralıklarla 4 uygulama

İLACIN HAZIRLANMASI ve KULLANILIŞI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda Oraban® 10 SL başka bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Kültür bitkilerinde çıkış sonrası kullanılmalıdır.

Ayçiçekte : 1. ilaçlama 8-10 yapraklı dönemde 2. ilaçlama, 14-16 yapraklı dönemde yapılır.
Kırmızı Mercimekte : 1. ilaçlama 8-10 cm boyundayken (Mart başında), 2. ilaçlama 20 gün sonra yapılır.
Tütünde : Dikimden 20-25 gün sonra ilk uygulama yapılır ve 7-10 gün aralıklarla devam edilir. 110° yelpaze tipi meme kullanarak dekara 20-40 lt suyla uygulanması tavsiye edilir.

Üretici Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen - Almanya

Ruhsat Sahibi ve Pazarlayıcısı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hürriyet Bulvarı No: 18 Münir Birsal Plaza 2,
B Blok Kat: 7 Daire: 13-14-15 35230 Çankaya / İZMİR
Tel : (0232) 445 00 69 pbx
Faks : (0232) 441 12 82
Web : www.agro.basf.com.tr

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. bir ZİMİD üyesidir.



Oraban® 10 SL
Canavar Avcısı