



# Sebze İlaçlama Programı

**BASF**  
The Chemical Company

Fenolojik Dönem		Fide dönemi	Gelişme dönemi	Çiçeklenme dönemi	Meyve bağlama dönemi	Hasat dönemi
Hastalıklar	Mildiyö			Kocide® 2000 / Polyram® DF / Acrobat® MZ / Aviso® WG / Cabrio® TR		
	Külleme			Kumulus® DF / Candit® / Collis® SC / Signum® WG		
	Kurşuni küf					Signum® WG
	Erken yaprak yanıklığı			Kocide® 2000 / Polyram® DF / Aviso® WG / Cabrio® TR		
	Yeşil kurt					Alverde® / Fastac® 100 EC
Zararlılar	Yaprak kurdu			Alverde® / Nomolt® Süper / Cascade® 50 DC		
	Kırmızı örümcek					Masai® 20 WP
	Yaprak galeri sineği				Cascade® 50 DC	
	Yabancı ot					
Diğerleri	Dar ve geniş yapraklı		Stomp® Extra / Stomp® 330 E Basagran® / Raptor® Ultra Aramo® 50			
		QL Agri™ 35		Pix®		Surround® WP

\*Kullanmadan önce firmamıza başvurunuz.

®=BASF firmasının tescilli markasıdır.  
Kocide® 2000 DuPont firmasının tescilli markasıdır.



# Sebzede ruhsatlı olan ürünlerimiz

**BASF**  
The Chemical Company

## FUNGİSİTLER

### Acrobat® MZ

%9 Dimethomorph + %60 Mancozeb / WP (Islatılabilir Toz)  
**Hıyarda yalancı mildiyö** (*Pseudoperonospora cubensis*) 200 gr/100 lt su - 5 gün  
**Soğan mildiyö** (*Peronospora destructor*) 200 gr/100 lt su - 5 gün  
**Patates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 250 gr/da - 5 gün  
**Domates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 250 gr/100 lt su - 5 gün

### Aviso® WG

%57 Metiram + %4,8 Cymoxanil / WG (Suda Dağılabilen Granül)  
**Kabakgillerde yalancı mildiyö** (*Pseudoperonospora cubensis*) 200 gr/100 lt su - 14 gün  
**Patates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 200 gr/100 lt su - 21 gün  
**Domates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 200 gr/100 lt su - 21 gün

### Cabrio® TR

%55 Metiram + %5 Pyraclostrobin / WG (Suda Dağılabilen Granül)  
**Hıyar mildiyö** (*P. peronospora cubensis*) 250 gr/100 lt su - 7 gün  
**Domates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 200 gr/100 lt su - 7 gün  
**Karpuzda erken yaprak yanıklığı** (*Alternaria cucumerina*) 200 gr/da - 7 gün

### Candit®

%50 Kresoxim-methyl / WG (Suda Dağılabilen Granül)  
**Kabakgillerde külleme** (*Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.*) 25 gr/100 lt su - 4 gün

### Collis® SC

100 gr/lt Kresoxim methyl + 200 gr/lt Boscalid / SC (Süspansiyon Konsantre)  
**Domates küllemesi** (*Leveillula taurica*) 50 ml/100 lt su - 3 gün

### Kocide® 2000

%53,8 Bakır Hidroksit (%35 Metalik bakıra eşdeğer) / DF (Suda Dağılabilen Kuru Akışkan Granül)  
**Domateste erken yaprak yanıklığı** (*Alternaria solani*) 200 gr/100 lt su - 14 gün  
**Patates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 200 gr/da - 14 gün

### Kumulus® DF

%80 (ağ/ağ) Mikronize Kükürt / DF (Suda Dağılabilen Granül)  
**Kabakgillerde külleme** (*Erysiphe cichoracearum*) 400 gr/100 lt su - 7 gün  
**Patlıcangillerde külleme** (*Leveillula taurica*) 400 gr/100 lt su - 7 gün  
**Soğan mildiyö** (*Peronospora destructor*) 300 gr/100 lt su - 7 gün  
**Fasulye pası** (*Uromyces phaseoli*) 300 gr/100 lt su - 7 gün

### Polyram® DF

%80 Metiram Kompleks / DF (Suda Dağılabilen Granül)  
**Domateste erken yaprak yanıklığı** (*Alternaria solani*) 175 gr/100 lt su - 5 gün  
**Domates mildiyö** (*Phytophthora infestans*) 150 gr/100 lt su - 5 gün

### Signum® WG

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin / WG (Suda Dağılabilen Granül)  
**Domateste kurşuni küf** (*Botrytis cinerea*) 150 gr/100 lt su - 3 gün  
**Domates küllemesi** (*Leveillula taurica*) 60 gr/100 lt su - 3 gün  
**Biberde kurşuni küf** (*Sclerotinia laxa*) 150 gr/100 lt su - 3 gün

## AKARİSİT

### Masai® 20 WP

%20 Tebufenpyrad / WP (Islatılabilir Toz)  
**Domateste kırmızı örümcek** (*Tetranychus cinnabarinus*) (*Tetranychus urticae*) 75 gr/da - 3 gün  
**Fasulyede kırmızı örümcek** (*Tetranychus cinnabarinus*) 75 gr/100 lt su - 7 gün

## HERBİSİTLER

### Aramo® 50

50 gr/lt Tepaloxymid / EC (Emülsiyon Konsantre)  
**Soğan** 100 ml/da (Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde)

### Basagran®

480 gr/lt Bentazon / SL (Suda Çözünebilir Konsantre)  
**Bezelye** 200 ml/da (Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde) - 30 gün  
**Soğan** 200 ml/da (Soğanın 2-3 yapraklı döneminde) - 30 gün  
**Fasulye** 200-250 ml/da (Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde) - 30 gün

### Raptor® Ultra

40 gr/lt Imazamox / SL (Suda Çözünebilir Konsantre)  
**Bezelye** 100 ml/da (Erken çıkış sonrası dönemde)  
**Fasulye** 100 ml/da (Erken çıkış sonrası dönemde)

### Stomp® 330 E

330 gr/lt Pendimethalin / EC (Emülsiyon Konsantre)  
**Domates, patates ve soğan** 500 ml/da

### Stomp® Extra

450 gr/lt Pendimethalin / CS (Kapsül Süspansiyon)  
**Soğan** 300 ml/da

## İNSEKTİSİTLER

### Alverde®

Litrede 240 gr Metaflumizone / SC (Süspansiyon Konsantre)  
**Domateste yeşil kurt** (*Helicoverpa armigera*) 100 ml/da larva - 3 gün  
**Biberde pamuk yaprak kurdu** (*Spodoptera littoralis*) 100 ml/da larva - 1 gün

### Cascade® 50 DC

50 gr/lt Flufenoxuron / DC (Suda Dağılabilen Konsantre)  
**Hıyarda yaprak galeri sineği** (*Liriomyza trifolii*) 200 ml/100 lt su - 7 gün  
**Biberde pamuk yaprak kurdu** (*Spodoptera littoralis*) 150 ml/da - 7 gün

### Fastac® 100 EC

100 gr/lt Alphacypermethrin / EC (Emülsiyon Konsantre)  
**Domateste yeşil kurt** (*Heliothis armigera*) 50 ml/da - 14 gün

### Nomolt® Süper

150 gr/lt Teflubenzuron / SC (Süspansiyon Konsantre)  
**Biberde yaprak kurdu** (*Spodoptera littoralis*) 35 ml/da - 3 gün

## DİĞERLERİ

### Pix®

50 gr/lt Mepiquat-Chloride / SL (Suda Çözünebilir Konsantre)  
**Soğan ve sarmısak** 100 ml/da

### QL Agri™ 35

%35 w/v Quillay Özü / SL (Suda Çözünebilir Konsantre)  
**Kültür bitkileri** 3 lt/da

### Surround® WP

%95 Saf Kaolin / WP (Islatılabilir Toz)  
**Tam doz** %5'lik süspansiyon 5 kg/100 lt su  
**İlk uygulama** 50 kg/ha  
**1/2 doz** %2,5'lik süspansiyon 2,5 kg/100 lt su  
**Daha sonraki uygulamalar** 2,5 kg/100 lt su